

RHYNCHOTRAK®

Surveillez vos palmiers pour mieux les protéger



- Piège à phéromones
- Présentation : 2 réceptacles en plastique interchangeable + 1 panier amovible + 1 grille + 1 diffuseur de phéromones
- Composition : phéromones d'agrégation du charançon rouge du palmier, *Rhynchophorus ferrugineus* + synergisant (kairomone)
- Usage : Détection et suivi des vols de charançon rouge du palmier, *Rhynchophorus ferrugineus*
- Sans délai de ré-entrée
- Durée de vie : 100 jours en moyenne
- Conservation : 1 an à température ambiante



RHYNCHOTRAK®



MODE D'ACTION

- Les charançons rouges mâles produisent naturellement deux phéromones d'agrégation, la 4-méthyl-5-nonanol (ferruginéol) et la 4-méthyl-5-nonanone (ferruginéone) afin d'attirer leur congénères mâles et femelles sur un palmier.
- Le diffuseur Rynchotrak® contient les phéromones stabilisées et synergisées afin d'attirer les charançons rouges du palmier dans un piège.
- Leur dénombrement dans le piège donne des informations sur la période d'activité de vol des adultes et sur la densité des populations présentes. C'est un outil d'aide à la décision pour déclencher les traitements.

MISE EN PLACE

- Enterrer l'un des réceptacles du piège et placer le panier amovible au fond du piège. Ajouter éventuellement de l'eau dans le fond (1 cm environ).
- Retirer le bouchon du diffuseur et le visser au centre de la grille. Clipsier cette dernière dans la partie supérieure du piège. Maintenir dans la position la plus verticale possible (col du diffuseur vers le haut).



- Un appât alimentaire type barre de céréales peut être suspendu à la grille pour optimiser l'attractivité du piège.
- Refermer le piège en clipsant la partie supérieure sur la partie enterrée.
- Un piège est efficace pour environ 30 palmiers situés dans une même zone de 150 à 200 m de diamètre.
- Respecter, dans la mesure du possible, une distance de 3-4 mètres avec le palmier le plus proche.

PÉRIODE D'UTILISATION

J F M A M J J A S O N D

- Période minimale d'utilisation du Rynchotrak®
Nous recommandons une utilisation continue tout au long de l'année.

RHYNCHOTRAK® - Composition : phéromones d'agrégation du charançon rouge du palmier

DANGER

H225 : liquide et vapeurs très inflammables

H319 : provoque une sévère irritation des yeux

H336 : peut provoquer somnolence et vertiges - Porter des gants lors de la manipulation du diffuseur - Se laver abondamment les mains après chaque utilisation.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi, se référer à l'étiquette du produit. ® Marque déposée Arysta LifeScience SAS.

LES RELEVÉS

• QUAND EFFECTUER LES RELEVÉS ?

Les relevés doivent être effectués au moins une fois par semaine, voire plus en forte période de vol.

• QUE FAIRE EN CAS DE CAPTURE DE CHARANÇONS ROUGES ?

La présence de charançons rouges dans le piège peut démontrer l'existence d'un foyer dans un rayon de 150 à 200 m. Il est alors nécessaire de contrôler visuellement chaque palmier de la zone.

- En cas de découverte d'un palmier atteint,

Alerter immédiatement votre fournisseur.

- Si aucun palmier ne présente de dégâts, appliquer un traitement insecticide préventif autorisé par l'arrêté du 21 juillet 2010 contre le charançon rouge sur les palmiers de la zone.

AVANTAGES MULTIPLES

- Un seul et unique diffuseur pour les phéromones et le synergisant.
- Diffusion simultanée et en proportions stables des phéromones et du synergisant : une efficacité longue durée renforcée.
- Autonomie : 100 jours en moyenne.
- Contrôle visuel du niveau.
- Stockage facile du diffuseur : 1 an à température ambiante.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

